TITRES

-

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DΟ

DOCTEUR PAUL THIÉRY



PARIS

MASSON ET C¹, ÉDITEURS LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

4.



TITRES ANATOMIQUES

AIGE D'ANATONIE (1886-1887-1888), PROSECTEIR A LA PACELTÉ (1889-1896-1894), AGRÉGÉ (SECTION D'ANATONIE) (1895), MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ANATONIQUE, MEMBRE DE L'ASSOCIATION DES ANATONISTES.

TITRES SCIENTIFIQUES

INIERRE DES ROPITATS (1886-1857-1888-1889).

DOTTER EN MÉRICERN (1890).

CHIEF DE CLINQUE CHIERROCLAR (1892-1893-1894).

ASSISTANT DE CONSULTATION (1895).

CHIRTHORIS DES ROPITATS (1897).

MERBER DE LA SOCIÉTÉ DE CHIERROGIE (1906).

CHIRTHORIS DE L'ROPITAL TESON (1906).

TITRES DIVERS

Mention honorable de l'Assistance publique (Trachéotomie et insufflation directe, 1887-1889).

Lauréat de la Faculté de Paris (Prix de thèse, médaille d'argent, 1890).

Lauréat de l'Académie de Médecine (Prix Laborie, 1890). Mention honorable de l'Institut (1890).

Mission scientifique en Ecosse, Danemark, Suède et Norvège (1890).

AVANT-PROPOS

En parcourant la brochure imprimée de mes « Titres et Travaux », on put être frappé au prenier abord de leur répartition inégale, et puisque cette publication est une sorte de révision où le candidat doit exposer quelle a été l'orientation de son travail, j'insisterai d'abord sur un point, très sincèrement, je dirais persque tels loyalement.

Il existo, en fait, deux catégories de travaillieurs : coux qui, s'occapant surrois au laboratiorie, cherchead quelque point norous à apprefondir. Fétatilent et en font l'objet d'une publication, et eux qui, utilisant les dounnées ainsi soquiess, en font la base de leur enveignement, s'adonnent avec passion à cet enseignement, conservest du temps, et il est juste de le dire du tarvail aussi, à répandre la science pour faire de leurs d'élèves des particleus sérimes et sistemits.

Pour plus simple que paraisse la táche, elle a aussi sea dificultés. Quoi qu'il en soit, c'est ce role plus modeste que nous avons surtout rempli, occupant souvent près des élèves un temps que nous cussions pu employer à la publication; nous avons pensé que, placé par la Faculté près d'eux aux divers titres d'aide d'anatomie, de prosecteur et d'agrégé, nous leur devions le mesilleur de notre temps.

Pendant vingt-deux ans, c'est-à-dire de 1886 à l'époque actuelle, cela a été ma principale préoccupation, comme en témoigne le résumé de l'enseignement anatomique que j'ai fait pendant ce temps. Dans le même ordre d'idées je signalerai, l'intérêt que j'ai apporté à la visite d'institutions étrangères, les Ecoles pratiques d'Ecosse, de Danemark, Suède et Norvège en particulier.

Si je zi jas publić d'ouvrage anatomiques de longue haleine, c'eu qu' festime qu'un travail de ce ganre estige de l'ige, de l'autorité et une lurge installation dont je n' à pri jusqu'à présent bachédier: aimi que je le dissis plus haut, ju cherché à combler cette lacean, en apportant à l'enseignement plus d'ardeur et ce instituant à obté des cours dont j'étais obligatoirement chargé, des conférences binéroles dont les dièxes ont a reitre outeure profit.

Je diviserai l'exposé de mes Titres et Travaux en plusieurs parties ;

- A. Enseignement anatomique.
- B. Publications anatomiques.
- C. Enseignement divers.
- D. Publications diverses.

ENSEIGNEMENT ANATOMIQUE

Sans parler des conférences d'Externat et d'Internat que j'ai dirigées pendant quatre ans, je mentionnerai seulement :

A. — LEGONS D'HISTOLOGIE NORNALE, D'HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE ET DE BACTÉRIOLOGIE PAITES A L'EOPITAL DU MIDI (1886).

Dès l'année 1886, grâce aux encouragements de M. le professeur Farabeuf, nous avons pu faire très régulièrement des Conférences d'histologie suivies par une trentaine d'élèves.

Ces leçons, au nombre de 29, ont passé en revue l'histologie nonmale (17 lecons) et les notions détenuites d'histologie pathologique (3 leçons) et de bactériologie (7 leçons) les plus utiles à cette époque; loutes ons leçons élaient accompagnées de démontrations pratiques, d'estitées à les revuêre à la fois plus attrayantes et plus protibilles pour les élèves. Elles ont été reprises en 1889 dans les pavillons de l'Ecole pratique.

 B. — Conférences d'anatomie descriptive faites a l'École fratique (4886-4894).

Ce sont les conférences et démonstrations que j'ai faites en qualité

d'aide d'anatomie et de prosecteur à l'École pratique aux époques suivantes :

```
1885-1886. Aide d'anatomie bénévole. Pavillon V.
1886-1887. Aide d'anatomie. Pavillon II.
1887-1888. Aide d'anatomie Pavillon VII.
```

4888-1889. Aide d'anatomie chargé des fonctions de prosecteur. Pavillon VII.

En qualité de prosecteur, j'ai fait des conférences plus nombreuses :

```
1889-1890. Prosecteur. Pavillos II.
1890-1891. Prosecteur. Pavillos V.
1891-1892. Prosecteur du professeur d'anatomie, chargé des élèves
du laboratoire narticulier de M. le Professeur Farabeuf.
```

C. — DÉMONSTRATIONS DE MÉDECINE OPÉRATOIRE CLASSIQUE, A L'ÉCOLE PRATIQUE, 1889-1892.

Ce sont les leçons de médecine opératoire qui incombent au prosecteur. Ces leçons, comprenant surtout les ligatures et les amputations, comportent une partie importante d'anatomie topographique dont la médecine opératoire est l'anolication immédiate.

> D. — CONVÉRENCES DE MÉDECINE OPÉRATOIRE SPÉCIALE. ECOLE PRATIQUE (4889-4892) (4).

Outre les leçons de médecine opératoire classique qui, d'après les règlements de l'École, sont faites par le prosecteur, nous avons pu, avec l'assentiment de M. le Doyen, de M. le professeur Farabeuf et de M. le

⁽⁴⁾ Si nous mentionnons ici ces leçons, c'est que l'anatomie topographique y tennit une place aussi importante que le manuel opératoire proprement dit.

D' Poirier, agrégé chef des travaux, instituer des conférences d'un ordre spécial. On nous permettra, pour en rendre compte, de reproduire le rapport que nous avons rédigé sur ce sujet :

« Monsieur le Doven.

- « Après avoir quitté l'École pratique, j'ai l'honneur d'attirer votre bienveillante attention sur l'enseignement de médecine opératoire spéciale que j'ai officieusement donné au cours des leçons de médecine opératoire que j'ai faites en qualité de prosecteur.
- « Frappé de ce fait que si les élèves recevaient un enseignement complet en en qui concerne les opérations classiques difier d'examen et de de concern samputations et ligarires), lis n'étaient point, d'autre part, mitités à la prariege des opérations conventes de la étimente plannalitée; j'ai eru tille d'institues à l'École praiique, d'abord avec de faiblesressources, puis avec celles que voulet lites m'accoder N. la Dyen, des leçons qui permissent aux élèves de se famillariser avec cette pratique courants.
- « M. le Professeur de médecine opératoire, obligé par la nature même de son enseignement de limiter son programme, ne pouvant répéter toutes les opérations dans un amphilibétire trop grand, devant une multitude d'élèves trop éloignés, est naturellement forcé de restreindre, dans son cours, à un petit nombre de cas cet enseignement (1).
- « J'ai donc fait appel à la bonne volonté de tous, et, muni d'abord d'un arsenal de chirurgie très rodimentaire, enrichi plus tard par un achat d'instruments de 600 france environ que m'accorda M. le Doyen, J'ai pu convoquer et relenir un auditoire bénérole assez nombreux pendant les semestres d'été de 1800, 1891, 1892.
 - « Les élèves voulurent bien y assister : la première année j'en pus

⁽¹⁾ Nous faisons remarquer que ce rapport date de 1850, époque à laquelle les traranx pratiques de médecine opératoire spéciale n'existaitent pas. Actuellement, cette lacune a été combiée et cet enseignement est fait à l'École pratique dans des conditions qui ne lisiesent rien à désilore.

compter quarante environ — plus de cinquante-cinq en moyenne la seconde — et quarante environ la troisième.

- « Il faut attribuer ces variations à l'époque même à laquelle le cours avait lieu, et pour l'année 1892 à ce fait que les travaux pratiques avaient en lieu alors que les élèves de la Facellé non asterias aux travaux pratiques croyaient l'École fermée et n'avaient pu être renseignés sur l'existence de ces leçons supplémentaires, le règlement ne permettant pui d'apposer d'affiches.
- \propto On peut affirmer que ce cours pourrait attiver une assistance de cent élèves $au\ minimum.$

En résumé, je crois être arrivé aux résultats suivants :

4° Réunir de nombreux élèves, au nombre desquels figuraient beaucoun de decteurs étrangers:

- 2° Passer en revue devant eux, avec application pratique sur le cadavre, la plupart des opérations de chirurgie courante.
- Il y a donc là, monsieur le Doyen, une innovation à Isquelle M. le professeur Farabeuf et M. Poirier, chef des travaux matomiques, ont bien voulu donne leur apprechation. Les résultats qu'elle a donnés sont bons et peuvent être accrus en portant à la connaissance des étudiants l'existence de ces cours éminemment utiles, et il seruit facile d'en faire un enseinement officiel. Pour cela il suffiriit :
- 1º De charger tous les ans un prosecteur de l'École ou, à défaut, une époque déterminée et portée à la connissance des étudiants par la voie des affiches et des journaux médicaux, comme la chose a lieu pour les lecons de médeine opératoire classique faites par les prosecteurs.
- 2º D'établir un programme d'études analogue à celui qui m'a servi : vingt lecons environ suffiraient:
- 3º D'accorder au prosecteur ou au chef de clinique chargé des leçons, quatre cadavres entiers, nombre suffisant à la rigueur, car bien des opérations ne réclament pas l'intégrité du sujet et peuvent être pratiquées sur des têtes et des trones séparés et non utilisés.

De cette façon serait comblée une lacune qui existe dans l'ensei-

gnement des élèves, lesquels reçoivent une instruction pratique de physique, chimie, anatomie, physiologie, histologie et restent privés d'un enseignement qui sert tous les jours au praticien : la technique opératoire de la thirurgie courante.

On ne peut dire que l'hôpital y supplée : la plupart du temps, les opérations pratiquées sous le chloroforme ne permettent point à l'opérateur et ne lui donnant point le loisir d'expliquer et de démontrer les temps opératoires et les particularités anatomo-chirurgicales des diverses opérations.

Veuillez me permettre, monsieur le Doyen, de soumettre ces différentes condéférations à votre hante appréciation et de les fact suivre, à titre de preuve, de l'exposé des résultats que j'ai obtenus à l'École pratique pourreu, depuis nos leçons, de la presque totalité de l'Appareil instrumental nécessire.

Année 1890 (12 leçons).

En 1890, je faisais suivre immédiatement la leçon de médecine opératoire classique de la leçon de chirurgie courant. J'ài remarqué depuis que l'attention des élèves était fatiguée par ces séances trop prolongées et qu'il était préférable de diviser la leçon en plusieurs parties.

Cependant, en 1890, j'ai pu répéter devant les élèves, en dehors du programme officiel de l'École, les opérations suivantes réparties en douze leçons:

inistration du chloroforme. III* leços. Extirpation des amygdales.
Tamponnement des fosses nasales.
Cathétérisme de la trompe d'Eustache. IV* leçon. Trépanation du crâne.
Trépanation de l'apophyse mastoide. V* legon. Anus iliaque et sutures intestinales. VI leçon. { Ponction de la vessie. Uréthrotomie externe. VII* leçon. Résection des côtes. Empyème. Thoracentése. (Thorncontées.

VIII tepes.

Hydrocaie.

Lix kepes.

X' kepes.

X' kepes.

X' kepes.

Kleine (Armajde.

Téconicaie.

Kleine (Armajde.

Téconicaie.

Kleine (Armajde.

Téconicaie.

Tállica périedae de hydrojastríque.

Tállica périedae de hydrojastríque.

Années 1891 et 1892 (20 lecons).

Au cours de mes leçons, en 1891, j'ai notablement étendu mou programme primitif et j'ai pu régéter environ soixante-dix opérations, c'est-d-dire passer en revue la presque toalifié de la chirurgie courante; j'ai même abordé quelques spécialités d'incontestable utilité. Voici d'ailleurs le classement des opérations répétées au cours de ces deux séries de leçons, Chaema d'elles comprenait trois parties :

De 4 heure à 2 heures. — Médecine opératoire classique : leçon du prosecteur.

De 2 heures à 3 heures. — Répétition par les élèves des opérations enseignées.

De 3 heures à 4 heures t/4. — Leçon pratique de chirurgie courante par le prosecteur avec démonstration préliminaire d'anatomie topographique.

Incisions. Satures. Extirpation des petites tumeurs. Application des appareils platrés. Chirozoia Hémostase des moignons. générale. Application de la bande d'Esmarch. Anesthésie chloroformique. Anesthésic locale par divers procédés. Cathétérisme. Taille périnéale. Lithotritie. génito-pri-Instillations uréthrales. Cure du varico-Uréthrotomie interne. Castration. cele. Uréthrotomie externe. Taille hypogas-Care de l'hydro-Ponetion de la vessie oble.

Organes
génitaux de
la femme. Périnéorraphie.
Amputation du coi de l'utérus.
Hystérectomie vaginale.
Extirpation du sein.
Opération d'Alquié-Alexander.

Ablation des amy gdales.
Amputation de la langue.
Résection du maxillaire supérieur.
Tube
digestif.
Avulsion des dents.
Diagnostie et extraction des confirmerers de l'ossophage.

étrangers de l'esopl Œsophagotomie. Gastrotomie. Anus iliaque.
Fistule anale.
bilatation de l'anu
Hémorrotdes.
stutures intestinale
Hernie étranglée.
Staphylorraphie.
Caneer des lèvres.

Yeux. Cataracte. Ectropion.

léstion du globe de l'œil.

/ Examens rhinoscopique et laryngoscopique.

Fosses asales.

Extirpation des polypes muqueux.
Cathétérisme de la trompe d'Eustache.
Tamponnement des fosses nasales.

Extirpation des polypes naso-pharyngiens.

Ongle incarné.

Suture des perfs et des tendons. Recherche des projectiles par le stylet électrique.

Amputation des modifes in stru.

Fixidement des modifes in stru.

Fixidement des modifes pour la réduction des luxations.

Amputations atypiques des doigts écrasés.

Ténotomie.

Ostéctommie et ostécclasie.

Groffes cutandes. Opération de Gritti.

Opération de Vladimiroff-Mickulicz,

Trépanation du crâne. Tete, Cou,
Tronc.

Trepanation de l'apophyse mastoïde.
Thoraccatése.
Empyème.
Résections uni et pluricostales.

E. - CONFÉRENCES D'ANATORIE A LA FACULTÉ.

Semestres d'été : 1895-1897-1899-1901.

En qualité d'agrégé, j'ai été chargé des conférences d'anatomie pour le semestre d'été. Chaque semestre a compris 45 leçons environ, au cours desquelles j'ai pu passer en revue l'anatomie complète de la tête. du cou, du thorax et du membre supérieur.

l'insisterai un instant sur l'esprit de ces conférences. Permandi que al les dièves neigligent perfois l'Indué de l'anatonis, c'est qu'ils na compennent pas assec qu'elle forme la base de strieues études mulicles, que s'ils treveut cette seience arisé, c'est que l'on ne s'offeres jamsis sasse de leur en démontrer l'utilité et les liens droits qui praissent à la clinque, p'il contament cherché à leur montrer qu'à chacune des connissances anatomiques correspondait une décaution pratique et, sus parter de l'anatomie teopraphaique telle qu'ilsé dait autrefois comme et qui peut être considérée comme une forme spécial de l'unatomie, j'al cherché à le uri faire compensagle raitett de l'Onatomie appliquée aussi iden à la physiologie qu'i la médecine et à la chirurgie, parties miem à la héryactique.

Il était adousaire, pour reteair l'attention de suititeur, de bien faire comprendre que l'anatonie n'est pas seniement l'Aistoire mêurée de l'homme, science déjà réservée à une orientation apéciale des apitudes, mais que chaque jour en clisique le praticien devait avoir recours aux moison précises c'antaneire acquises des ses premiteres études, pour établé un diagnostie et discoter un traitement, pour faire en un mot acté de méciel ans l'acception noble du moé.

Il était enfin nécessaire de captiver l'attention des élèves et d'entretenir entre les plus assidus une sorte d'émulation. Chargé de conférences, j'ai eru devoir sacrifier quéquefois la forme à l'utilité, d'où le mode d'enseignement que j'avais adopté sous le nom de Colloques anatomismes.

Au cours de la leçon proprement dite, j'ai pris l'habitude de poser de temps en temps des interrogations aux auditeurs des conférences, syant parfois l'air de leur demander de combler une lucune de la mémoirce ou du dessin présenté. Les élèves m'ent toujours para prendre ples par mai factée à ce mode d'enoignement qui, trop familler pour un cours magistral, ne me paraissait pas déplacé dans une conférence commémonation.

F. - Enseignement au Laboratoire (1897-1905).

Depuis le semestre d'été 1897, la Faculté a mis à la disposition des agrégés chargés de conférences un local destiné à la préparation de leurs lecons en autorisant des élèves à y travailler.

J'ai done pe fuire disséquer une quinzaine d'élèves établisais et decleurs étranger podant l'amnés 1557 et une diziais environ, tous les aus gendant les semestres élitiere. J'ai cherchè à dirigre ces élèves dans leur dissection, à contrôler leur travuil par de fréquentes interregations. Ente, j'ai institué de petites conférences d'anaisomie où chaeun des élèves s'excepcial à peradre la parole bur à tour, et tirait le pes game proit de cet enseignement mutet. De nonhuva docteurs étrangers y prenaisent le plus grand intérêt et en témolganisent par leur empressement à se faire inserir en alboratoire.

G. — Visite aux Écoles pratiques d'Ecosse et des Pays Scandinaves.

Au cours de la mission dont nous avons 46 chargé en 1890 par M. la Ministro d'Instruction publique à l'effect d'induirie les établissements d'enseignement et les hôpitaux de l'Ecosse et des l'ays Seandinaves, notre attention s'est portée spécialement sur les Ecoles pratiques et les Amphiliétéres de dissection d'Eliniongr, de Danemat, et de Suide et Norvège : nons avons pu y recueillir un assez grand nombre de documents in téressaries.

Parmi les établissements que nous avons visités nous signalerons :

Edimbourg. — 1º Amphithéâtres de l'Université, dirigés par le Professeur Turnes

> 2º Minto-House ou École de dissection, dirigée par Sir J. Symington.

Copenhague. — Ecole pratique, sous la direction du professeur Chiewitz.

Christiania. — Laboratoire d'anatomie et d'histologie, dirigé par le profesGustav Guldberg.

Stockholm. — Ecole pratique de Carolinska Institutet, dirigée par le professeur Retzius.

Upsal. - Université.

De cette visite aux Universités écossaises et scandinaves, nous avon pette pet des documents inféressants sur la préparation des piñces par corrosion (Copenhague), sur la riche collection d'anatomic comparée et de craniclogic de Stechhafas, sur les helles préparations de l'appareil auditif du professeur Retziuset sur les collections d'authropologie égyptienne conservées au Musée de Carolinaka Institutet.

En Ecour, nous vous surtout étailé le fonctionnement adminiturif des travaux pratiques de dissociani; les droits de évories des Professeurs, du Senice demoutrates of amottouy, des Doctures aides d'amatomie et des Moniteurs établismes, incitations qui nétrieural d'être initée; nous en avons aussi rapporté des idées sur la parcimonieurs réportifien des cultures, compatible avec un enscignamme souteme et intensi, et il nous en reviè de notre visite à l'University moliteut and movied une impression très favrandies.

Ampèra de Symington, nous avons étudié la préparation des pièces connervées humbles pour les démonstrations et qui à pen de frais, peuvent étre réparabues à profusion dans les partillens; nous avons pu, en modifiant ses percidés, instituer un mode o perporation et de conservation dont nous parbons plus loin et qui mériterait d'âtre pris en considération, car la présence de ces pièces de démonstration dans non amphithétires de direction, constamment exposées aux yeux des diverse, combiners inne learnes la loquelle ne remédient pas nos Murées, un pen trop défaissés par les élèves, et permetirait soit pour l'extre de diverse, de l'étable de l'analonie pendant l'été est pour le servée des examens pratiques d'analonie, de disposer d'un matérial pes coûteux et d'une incontestable utilité, quelapses interpositions ur l'une de ces pièces remésignant mieux le professeur sur la valeur de l'élève qu'une découvele hitté d'un coranne unisses.



TRAVAUX

.

PUBLICATIONS ANATOMIQUES (9)

I. - Note sur trois cas de valvules de la muqueuse préputiale.

(Bull. Soc. Anat., mars 1891, 5° série, t. V, fasc. 8.)

 $1\ \langle bis
angle.$ — Note sur un nouveau cas de valvules de la muqueuse préputiale.

(Bull. Soc. Anat., juin 1894, 5° série, t. VIII, fasc. 11, et in Titres et Travaux.

Agrégation 1895, page 23.)

Ces notes sont consacrées à une disposition valvulaire de la muqueuse du prépuce qui, bien que non décrite antérieurement, est loin d'être exceptionnelle. En 1894, Mermet en a relaté cinq autres

⁽¹⁾ La part de travail que j'ai consecré à l'Enseignement sen pout-tère une access pour la valuer et le nombre vositeit de ces publications qu'opique-mes d'entre olles nota tiodites. Le m'insistent pas sur quelques publications mittes arraquettes l'assonient et la publicación pierment affectuent par « telle se sont analysées dans use brechure Tière et Pressur publiés en moment du concorre d'Agrégation de 1902 et mentionnées dans la présente brecherre au despite publications discresa.

cas à la Société Anatomique, et, s'appuyant sur les recherches de Retterer sur le développement du prépuce et du gland, cet auteur croit comme nous que ces valvules résultent d'une diférenciation erratique de l'invagination épidermique balano-préputiale.

Sur les rapports anatomiques du pli fessier.

(Bull. Soc. Anat., avril-mai 1891, 5° série, t. V, fasc. 10 et Comptes rendus de l'Ass. des Anat., 1° session 1899, p. 123).

An cours de nos dissections à l'École pratique, notre attention avait et attrice sur ce dait que lei, nde correspondes au hord inférieur du grand fessier, le pli fessier croisait sa direction à angle sign. Il est impossible, mais à des faiscaux fibreux qui, partis de la tabéronité de l'Inchion, viennaix s'insérer à la fessie profiende de le pla pous. Nos recherches confirment donc les observations antérieures de Louchka, de Symington et de N. Poirier sur ce sujet.

De la Polythélie (mamelons surnuméraires). Statistique et théorie embryogénique.

(In Titres et Travaux 1895, et Leçon orale d'Agrégation 1895.)

Nos recherches sur ce sujet, entreprises à l'instigation de M. Chauffard, datent de 1885 et portent sur l'examen de plus de 3.000 sujets. Elles nous ont amené à conclure :

- 1º Que les mamelons surnuméraires sont extrémement fréquents (environ un ces sur trente suiets pris au hasard);
- 2º Qu'ils se disposent par paire sur une ligne oblique allant de la mamelle à l'ombilie, le type complet comprenant trois paires de mamelons y compris les mamelons normaux;

3º Qu'on peut entre la simple ébauche et le mamelon parfait suivre la gradation suivante :

- a, tache pigmentaire.
- b. tache pigmentaire avec poil isolé. c. touffe de poils en tourbillon.
- d. mamelon sans aréole.
- e. mamelon avec aréole et couronne de poils.

Leur structure varie : c'est tantôt un simple nodule de tissu conjonctif; tantôt il existe des granulations jaunătres au milieu de fibres musculaires lisses; enfin la glande peut être développée et même on peut observer des canaux galactophores avec excrétion de lait.

Les différents types peuvent coexister, mais les mamelons supérieurs répondent toujours à une conformation plus parfaite que les inférieurs.

Il s'agrit de la persistance d'une disposition embryonnaire, suivant nous normale (type à 6 mamelles), plutôt que d'une anomalie ancestrole.

IV. - Note sur un cas de malformation singulière de la voûte palatine d'origine congénitale.

(Bull, Soc. Anat., juin 1894, 5° série, t. VIII, fasc. 11.)

Cette note a rapport à une malformation de la voûte palatine constituée par deux saillies latérales, symétriques, dures, insérées sur les parties latérales de la voûte palatine et venant s'accoler sur la ligne médiane. Congénitalité certaine. Cette anomalie nous paralt excessivement rare.

22

V. - De la présence du sucre dans le liquide hydrocéphalique.

(Progrès méd., 3 avrit 4886, 2º série, t. III.)

Nous avons démontré que le liquide céphalo-rachidire nontensir no pas du sucre, comme l'ont indiqué le plupart de santure, mais de l'alcaptone, c'est-à-dire une substance qui, tout en offrant les réactions chiniques du sucre, ne produit pas la dévisition polarmétrique caractéristique. Cets substance existe dans le liquiée dépulà-rachidien non pas en raison de la quantité de sucre contenue dans le sunge, mais en proportion nothèment supérierus.

VI. — Confirmation du rôle physiologique des canaux semi-circulaires et de la corde du tympan.

(Bull. Sec. Anat., mai 1888; 5* série, t. It.)

Nous avons pu, à propos d'un cas intéressant où la corde du tympan était sectionnée et les canaux semi-circulaires lésés ;

1º Confirmer les recherches de Lussana et Inzani, qui font de la corde du tympan un nerf de sensibilité gustative, et celles de Claude Bernard qui en fait dépendre la sécrétion de la glande sousmaxillaire;

2º Constater la réalité du rôle d'équilibration attribué aux canaux semi-circulaires par Flourens et Brown-Séquard, Vulpian, Harless et Czermak.

VII. – L'appendice iléo-cæcal et ses hernies. Remarques et observations.

(In Titres et Travaux 1895, page 48, et in Thèse de Alti, Paris, 1895.)

VIII. — Des kyates du parovaire avec persistance du canal de Gartner. (En collaboration avec Philipp.)

(In Thèse de Girerd, Paris, 1894.)

La présence du canal de Gartner en continuité avec un kyste du parovaire est une preuve en faveur de la théorie du développement des kystes du parovaire aux dépens des restes de la portion génitale et non urinaire du corps de Wolff.

Expériences sur l'absorption des liquides médicamenteux et toxiques par la tunique vaginale.

(In Thèse de Larabrie, Paris, 1895.)

Nous fundant sur des expériences personnelles, sur l'absorption de l'induré de plexistim par la vaginale, nous sommes arrisé à conclure que la vaginale de l'homme enflammée na peut être considérée comme absorbant plus rapi l'enneul te la liquide toxiques que le tissu cellulaire des boursers; no pouvier d'absorption est relativement fuible, constatation importante pour l'expériencien de certains faits eliniques d'intoricion par résorption des liquides toxiques insigérés dans la vaginale cuidon par résorption des liquides toxiques insigérés dans la vaginale

X. - Anomalie du tronc cœliaque.

(Bull. Soc. Anat., déc. 1897.)

Il s'agit d'une anomalie peu commune de l'artère hépatique, qui se trouve dédoublée en artère hépatique droite et gauche, cette dernière donnant la coronaire stomachique. La pièce a été présentée à la Société anatomique (décembre 1897) par notre élère Chomet.

XI. — Bourse séreuse zygomatique du muscle temporal.

Cette étade incitite, actuellement en sours, concerne une bourse séreues, siáce au mievas du bord positérieur du musuée lempont, an point où les fibres de ce mascle se rédéchissent sur le rygoma. Cette bourse séreuse n'u pas été, ercyona-nous, representement décrite, bien que quedques auteurs aient signalé à ce niveau un tisse selluleux lièbe. Des recherches plus étendues sont nécessaires pour en étadier la fréquance.

XII. — Pièces sèches déposées au musée Orfila.

Ces pièces sèchies se rapportent à l'anatomic des vaisseaux et nerfs de l'orbite; ciles ont dés cultièment disséquées, préparées et montées par nous, et nous y avons utilisé, pour conserver la forme du globe oculaire, un procédé d'aipection par la parafiline dissoute dans le chloroforme qui n'avait pas été dessir.

XIII. — Note technique sur la préparation des pièces anatomiques destinées à être conservées (1).

Dans cette note nous résumons quelques procédés qui, combinés par nous, constituent une méthode spéciale de préparation et de présentation des pièces anatomiques destinées à l'enseignement.

Le montage des pièces sur plâtre, leur conservation dans l'eau alcoolisée ou leur conservation à sec, leur conservation par le formol y

⁽t) Cette note n'ayant pas été imprimée, a été remise par nous aux juges du dernier concours pour la place de chef des travaux anatomiques (1982).

étant décrits, nous avons pu conclure qu'ainsi préparées, les pièces anatomiques sont :

- i° Simples, suffisamment démonstratives pour l'élève:
- 2º Faciles à consulter, grâce aux tableaux qui les accompagnent;
- 3º Faciles à imiter : elles exigent un matériel peu coûteux, et un élève bien stylé peut apprendre à les monter lui-même en peu de jours :
- 4° Faciles à conserver, soit pendant plusieurs mois, soit pour une durée illimitée;
- 5º Elles sont lourdes, stables, avantage qui n'est pas à dédaigner pour leur exposition dans des salles très fréquentées;

6º Elles constituent une tentative assez originale et assez nouvelle pour mériter de trouver place dans les amphilitéâtres de dissection où se perdent journellement de nombreuse pérparation parfois hien disséquées et précisuses à conserver pour la démonstration des « leçons de choos», et pour l'enseignement de l'anatomie pendant les semestres d'étée.

A ces publications nous joindrons, en les signalant sculement, les tuivantes qui sont surtout du domaine de la physiologie :

- Des effets physiologiques de l'adonidine (in Thèse de Mordagne, 1885).
- De la recherche de la glycose dans les urines par l'acide picrique. (Progrèx Méd., juill. 1886, n° 14, p. 286-287.)
- C. Recherches sur la respiration artificielle (Gaz. Médicale, aoûtsept. 1880).
- D. Recherches sur la kératogénie et la kératoplastie (biologie des épithéliums). Implicitement comprises dans plusieurs de nos publications sur les usages thérapeutiques de l'acide picrique.

Et diverses publications sur la médecine opératoire dont on trouvers l'indication à la fin de cette brochure.



ENSEIGNEMENT DIVERS

Je ne ferai que signoler :

- A. La suppléance de M. le Prof. Tillaux, dans son service de clinique chirurgicale de la Charité (1894).
- B. La suppléance de M. le Prof. Pozzi, dans son service de clinique gynécologique de l'hôpital Broca, 1901 et 1902.
- C. Les exercices et conférences cliniques que j'ai faites en 1892, 1893 et 1895, pendant mon clinicat chez M. le Prof. Tillaux et qui réunissaient de nombreux élèves.
- D. L'enseignement journalier que je n'ai cessé de donner aux élèves dans les divers services des hôpitaux dont j'ai étéchargé soit comme chirurgien de la consultation, soit comme chef de service :

Charité: 1895-1897.
Pitué: 1898-1901.
Saint-Astoise: 1902-1905.
Ivry: 1905-1906.
Tenor: 1906.....

Cet enseignement s'est toujours inspiré de cette idée dominante que la clinique ne peut être scientifique que si elle est basée sur de solides connaissances anatomiques, et qu'à l'hôpital l'élève devrait être habitué à considérer l'anatomie comme un complément indispensable de la pathologie aussi bien qu'à la Faculté nous lui avions appris à considérer la pathologie comme le complément pratique de l'anatomie.

PUBLICATIONS DIVERSES

TRAVAUX DE LABORATOIRE

Note. — Nous avons cru devoir mentionner un certain nombre de publications qui, si elles n'ont point toutes directement rapport à l'anatomie, peuvent cependant témoigner d'une certaine activité.

Boancoap d'entre elles, d'ailleurs, out avec l'anatomic des poinis communs, stout in révultat de recherches de laboratoir; pendant six ans nous avons étudis l'histologie d'abord un laboratoire de l'Horel Dien, pais an laboratoire des divres hoghistux où nous avons étinierne et chef de clinique. Nous pourrioss citre notre collaboration à bien des recherches de laboratoire, celles de M. le D' Bedebotatine par exemple, et les examess et analyses que nous avons pratiqués pour M. les Professours Richet, Verneuril et Raymond, qui out hien voule avoir recours à nous pour un certain nombre de recherches histologiques, physiologiques et anatomiques, lesquélles, le cause des applications pratiques qui en ont été tirées, figurent sous la rubrique » Publications diverses de notre vegot de Titres.

De ce nombre je puis citer le diagnostic des chancres vénériens par l'examen histologique de leurs produits, des considérations sur l'appendice iléo-caccal et le mécanisme de ses hernies; des applications de l'insuffiation directe à la respiration artificielle. En ce qui concerne les épithéliums et leur biologie, nous nous sommes occupi de la question de la kératogénic dont nous avons appliqué les déductions au traitment des fruitures et des ulcères. étc...

Un cas clinique intéressant nous a permis de contrôler les expériences de Lussana et d'Inzani sur le rôle de la corde du tympan.

D'après ce qui précède, les publications suivantes ne sont donc pas toutes étrangères aux sciences anatomiques proprement dites et beaucoup d'entre elles s'y rattachent directement.

Médecine.

Note sur un cas de gangrène pulmonaire.(Bull. Soc. anat., 31 juill. 1885.)

De la valeur de la recherche des bacilles dans le diagnostic des affections tuberculeuses. (Progrès méd., nov. 1885, p. 455-458.)

Kystes crétilés des muscles d'origine indéterminée et probablement de nature parasitaire. (Bull. Soc. anot., janv. 1891, 5° série, t. V, fasc. 3, p. 73-74.) Traitement du zona par l'acide picrique. (In Th. de Delbecque, 1889.)

La maladie des plongeurs. (Observations et remarques in Th. de Labelle, Paris, 1898.)

Lésions professionnelles de la main chex les tonnellers. (Obs. in Th. de Sainturet, Paris, 1899.)

Traitement des érythèmes médicamenteux par l'acide pierique. (Observations et remarques, in Th. de Piéridés, Paris, 1990.)

Note sur un cas de trichinose observé à Paris. (Bull. Soc. anat., 34 juill. 4885.)

Maladies vénériennes.

Contribution à l'étude du diagnostic des chancres vénériens. (Progrès méd., déc. 1896 et Janv. 1887.)

Traitement chirurgical du chancre syphilitique non compliqué. (Gaz. méd., 1887, nº 10 et 12.)

- Contribution à l'étude du traitement abortif de la syphilis par l'excision du chancre. (Gaz. méd., aoêt 4888, n° 31, 32, 32 et 34.)
- cnance. (tax. med., août 1888, n° 31, 32, 33 et 34.)
 Essai de traitement des plaques muqueuses hypertrophiques par les applications de tannin. (Grz. méd. de Paris. 16vr. 1891.)
- Traitement de la blennorragie par les injections d'huile iodoformée. (Progrès méd., 5 mars 1887.)
- Essai de traitement méthodique de la blennorragie régulière chez l'homme.

 (Annales des maladies des organes génite-urinaires, juin 1891.)
- Traitement de l'orchite bleanorrogique par la teinture d'anémone pulsatile. (Cinquante obs. inédites, in Th. de Dormand, Paris, 1889.)
- La pulvérisation phéniquée dans le traitement de l'orchite bleanorragique. (Gaz. méd., oct. 1894 et nov. 1891.)
- Essai de traitement méthedique de l'orchite blennorragique. (Observations in Th. de Bétancès, Paris, 1893.)
- Contribution à l'étude du traitement de quelques lésions sous-préputiales. (Remarques et observations, in Th. de Gaudilard, Paris, 4888.)

Chirurgie générale.

Administration du chloroforme. (In Précis d'assistance, Paris, 1892.)

Contribution à l'étude de quelques procédés de respiration artificielle. (Gaz. méd., août 4887, n° 35. — Sept. 4887, n° 36. — Id., n° 37. — Id., n° 38.)

Remarques sur un nouveau cas de rappel à la vie par la trachéotomie suivie d'insufflation directe dans le traitement de l'asphyxie alguë. (Gaz. des Hôp., 16vr. 1894, p. 174 à 177.)

Précis d'assistance aux opérations. — Préparation du malade et des instruments. Anesthésie. — Soins consécutifs. (Paris 1892, 490 pages.)
Lymphangite et érysipèle.

Remarques relatives à l'étude de l'érysipèle dans l'état puerpéral. (Goz. méd. de Paris, 22 févr. 1890, n° 8. — 1" mars 1890, n° 9.)

Mélasiase purulente de l'anthrax. (C. R. du Congrès français de Chir., 1891.)

Remarques sur les néoformations d'origine inflammatoire consécutives à la présence des corps étrangers dans les tissus. (Bell. Soc. anat., juin, juillet 1803, 5° série, t. VII, fasc. 18.) 32

- Traitement des brûlures superficielles par la solution saturée d'acide picrique.
 (In Th. de Fillaul, 1891.)
- (in 11. de Priest, 1671.)

 Troisième note sur la trachéotomie suivie d'insuffiation directe. (Gaz. des Héa., 1895.)
- bes applications de l'acide picrique à la thérapeutique des brûlures. Kératogénie et kératoplastie. (Gaz. des Hóp., janv. 1896, n° 8.)
- Des applications diverses du pansement picriqué à la thérapeutique chirurgicale. (Goz. des Hôp., 1896, n° 25.)
- Le pensement picriqué. Ses divers modes. Technique et innoculté. (Gaz. des $H\delta p_*$, 14 sept. 1897, n° 104.)
- De l'emploi de l'éther picriqué dans la réunion des plaies opératoires ou désinfectées par la suture. (C. R. du Congrès de Chir., 1899, p. 614.) Botryomycose. (Plusieurs observations, in Th. de Gahinet, Paris, 1902.)
- Botryomycose. (Plusieurs observations, in Th. de Gahinet, Paris, 19 De l'emploi de l'acide picrique en art vétérinaire. (Gaz. des Hép.)
- Deuxième note sur l'emploi de l'acide picrique en art vétérinaire. (Gaz. des
- Hôp., avril 1898.)
 Observations radiographiques diverses. (Tub. du poignet. Spina ventosa. Coup de feu de la région du pied). (In Rayons X, nº 10 et 22, 1898.)
- Cornes cutanées développées sur des kystes sébacés. (Bull. Soc. anal., juillet 1898, t. XII, fasc. 14.)
- Actinomycose cervico-faciale. (Observations et documents, in Th. de A. Dhomont, Paris, 1899.)
- De l'emploi de l'acide picrique en thérapeutique. (Obs. in *Th. de Debacq*, Paris, **1899**.) Traitement des brâlures spécialement par l'acide picrique. (Documents in
- Th. de Dakkyl, Paris, 1838.)

 De l'emploi de l'acide picrique en thérapeutique chirurgicale et en derma-
- tologie. (C. R. du Congrés internation et de Méd., Paris, 1900.)

 De la trachéolomie suivie d'insuffiction directe dans le traitement de la mort
- per a recuevous envive a insunation directe tains se tratement de la mort apparente au cours de l'anesthésis chloroformique. (Congrès fronçais de Chir. C. R., 1906.) Traitement des plaies par l'oau oxygénée. (Obs. in Th. de Dugat, Paris, 1902.)
- Traitement des pares par l'oau oxygence. (Obs. in In. de Inigat, Paris, 1902.)
 Traitement aburtif des furoncies par les injections de gaz oxygène. (C. R. du Congrèz de Chir., 1903, 20 octobre.)
- Les accidents graves de la chloroformisation et les moyens d'y remédier. (C. R. du Congrès de Chir., 4904.)

- Étude sur les dérivés de l'oxygène et leur emploi dans le traitement des plaies superficielles. (Obs. In Th. de Redde, Paris, 4905.)
- A propos du massage du cœur et de la trachéotomie par insuffiation directe. (Bull. Soc. de Chir., 25 juillet, 1996.)
- Discussion sur la chirurgie des gros troncs veineux. (C. R. du Congrèz de Chir., 1906, p. 112.)
- Discussion sur la valeur du sérum antitétanique. (Bull. Soc. de Chir., XXXIII, n° 16, 1" mai 1907.)

Études sur les Tuberculoses chirurgicales.

- De la tuberculose chirurgicale; suites immédiales et éloignées de l'intervention; traitement pré et post-opératoire. (4 vol. de 600, p. Paris, 4890.)
- Suites immédiates des interventions chez les tuberculeux. (Études expér. et clin. sur la Tuberculose, t. II, fasc. 4, 4890, p. 628 à 670.)
- Remarques sur le pronostic éloigné et la récidive dans les tuberculoses locales; contribution à l'étude des suites éloignées de l'intervention. (Études expér. et clin. sur la Tuberculose, t. 111, fasc. 1, 4891.)
- Cure radicale des fistules ossifiuentes tuberculeuses par les instillations de chlorure de zinc à 1/10 et traitement des ostéo atthropathies fongueuses supparées par la fongotripaie et le brossage au chlorure de zinc. (Études expér. et cliu. sur la Tuberculese, 1893, p. 203 à 218.)
- Traitement des synovites fongueuses et à grains rixiformes de la paume de la main par l'extirpation totale des gaines. (In Cliniques de M. le professeur Tillaux, 4895.)
- Contribution à l'étude de la tuberculose locale du cœcum. (Progr. méd., nº 47, novembre 1894.)
- Ulcération tuberculeuse de la langue guérie par l'iodoforme et l'acide lactique. (In Etudés clin. et expér. sur la Tuberculose, t. II, 4890.)
- Tuberculose de la mamelle chez l'homme (citée in Traité de Chir. Duplay-Reclus, L. IV, p. 208.)
- Remarques sur les tuberculoses périphériques. (In Th. de Papazoglou, Paris, 1896.)
- Traitement des adénites tuberculeuses du con chez l'adulte. (C. R. du Congrès de Chir. de 1901.)

Grane, Gerveau, Face et Cou.

- De la suture dans les plaies du cuir chevelu. 34 observations inédites. (In Th. de Ribierre, Paris, 1888.)
- Contusion bipolaire oblique du cerveau. Fracture du crâne. Double trépanation. (Bull. Soc. anat., mai 4889.)
- Remarques et faits cliniques relatifs à l'opération du trépan. (Gaz. méd., août 1889, n° 34 et 35.)
- Remarques complémentaires relatives à la trépanation dans le traitement des épanchements sanguins paraduremériens. (Bull. Soc. anat., 1891, t. V, 5° série.)

 Nouvelle contribution à l'étude de la trépanation dans les cas douteux de
- contusion ou de compresssion cérébrales. (Bull. Soc. anat., févr. 1891, t. V, 5° série.) Cinquième note relative aux indications et contre-indications de l'interven-
- tion dans les complications des traumatismes craniens. (Bull. Soc. anat., 1891, t. V, 5* série.)

 Note sur un cas de prothèse immédiate du maxillaire inférieur. (Bull. Soc.
- anat., 4894, t. VIII, fasc. 44, 5° série.)

 Actinomycose cervice-faciale. (Bull. Soc. anat., avril. mai 1896, fasc. 10.)
- Un cas d'actinomycose de la région massétérine. (Présentation à la Soc. de Chir., 4896.)
- Coup de feu de la région du cou. Anévrisme artérioso-veineux, cousécutif avec radiographie. (Bull. de la Soc. de Chir., 47 févr. 1897.)
- Traitement de l'actinomycose péri-temporo-maxillaire, par les injections d'eau iodée. (Soc. de Chir., 16 nov. 1898.)
- Un cas d'actinomycose péri-temporo-maxillaire. (Soc. de Chir., 23 oct. 1899.) Un cas d'actinomycose péri-temporo-maxillaire. (Soc. de Chir., 7 mars 1900.)
- Neuvième cas d'actinomycose temporo-maxillaire. (Soc. de Chir., 21 mars 1900.)
 Onxième cas d'actinomycose temporo-maxillaire. (Soc. de Chir., 27 juin 1900.)
- Le traitement de l'actinomycose cervico-faciale. (Bull. es C. R. du Congrès de Chir., 4905.)
- Un cas d'actinomycose de la face. (Soc. de Chir., 26 février 1902.)

Poitrine et abdomen.

- Plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen. Blessure d'une intercestale, Hémonagumothogax, (Gaz. méd., nº 31).
- Deux cas d'échec de la laparotomie exploratrice. Difficulté extrême de la recherche de la lésion dans certains cas. (Bull. Soc. anat., juillet 1801, t. V(, 5° série.)
- Sur le choix du procédé opératoire dans la création d'un anus lliaque artificiel. Comparaison de la méthode française et de la méthode autrichienne. (Bull. Soc. anat., mars, avril 1889, t. III, 5° série.)
- Deux observations de cancer de l'intestin avec phlegmon pyostercoral. (Bull. Soc. anst., janv. 1890, t. IV, 5° série.)
 - Kystes hydatiques multiples du foie, de la rate, de l'épiploon et du pelvis. Cancer de l'estomac et de l'utérus. (Bull. Soc. anat., avril 1889, t. III, 5° série.)
 - Des fistules biliaires consécutives à l'opération de la cure radicale des kystes hydatiques. (Gaz. méd., nov. 1890, n° 45, et n° 46.) Cores étranger de la cavité péritonéale; extirpation, guérison. (Bull. Soc.
 - Corps étranger de la cavité péritonéale; extirpation, guérison. (Bull. Soc. anat., oct., nov. 1894, l. VIII, 5' série.) Orifice herniaire anormal du grand oblique pris pour une hernie graisseuse
- de la paroi. Laparotomie. Aponévrorraphie. (Bull. Soc. anat., juin 1862, t. VI, 5° série.)
- Occlusion intestinale par bride. Laparotomie. Guérison. (Bull. Soc. anat., oct. 1892, t. IV, 5° série.)

 Appendicocèle inguinale. Etranglement. Kélotomie. Guérison. Réflexions sur
- l'étrangiement hernisire partiel. (Buil. Soc. anat., juill. 1893, t. VI, 5' série.)

 Hernies de l'appendice idéo-cacal. (Remarques et observations in Th. d'Alti,
- Paris, 1894.)
- La perforation intestinale comme complication de la contusion herniaire. (Bull. Soc. anat., oct. 1892, t. VI, 5° série.)
 - Rupture de l'estomac de cause indirecte (par chute sur les ischions). (Bull. Soc. anat., mai 1889, t. III, 5° série.)
- Kyste hydatique suppuré du grand pectoral. (Bull. Soc. anat., nov. 4896.)

- Migration d'un sou dans le tube digestif avec radiographie. (Annales de radiologie théorique et appliquée, 5 fevr. 1898.)
- De l'abus des bandages herniaires dans le traitement de la hernie inguinale scrotale chez l'adulte. (C. R. du Congrès de Chir. de 1899, p. 429.)
- Note sur un cas d'appendicectomie à froid. (C. R. du Congrès de Chir. de 1901.
- Séance du 25 oct.).

 Eviscération considérable et plaies multiples de l'intestin. Laparotomie.
- Guérison. (Présentation par M. Reynier à la Soc. de Chir. le 17 mars 1893.)
 Traitement de l'appendicite. (Remarques et obs., in Th. de Boutes, Paris, 1899).
- Nouveau procédé de résection de l'appendice à froid. (C. R. du Congrès internat. de Méd., Paris, 1900).
- Choix du moment et du mode de l'intervention dans les appendicites. (Congrès de Chir., 1902.)
- La guérison du cancer du sein par l'ovarietomie est-elle possible. (C. R. du Congrès de Chir., 1904.)
- Discussion à propos du rapport de M. Villar sur la chirurgie du pancréas. (C. R. du Congrés de Chir., 1995.)
- Deux corps étrangers des voies digestives : sirène déglulle et bâton de chaise de 33 centimètres. (Soc. de Chir., 6 mars 1906.)
- Plaie du cœur par balle de revolver. Abstention. Injections intraveineuses de sérum, guérison. (Soc. de Chir., 12 avril 1906.)

Organes génito-urinaires.

- Note sur un cas de tuberculose du testicule à début aigu. (Bull. Soc. anat., janv. 1887, t. I, 3° série.)
- Tumeur à tissus multiples du testicule. (Bull. Soc. anat., 1894, fasc. 10.)
- Hématocèle traumatique du scrotum, consècutive à une fracture du bassin. Gangrène. Décortication des testicules. Guérison. (Ann. des maladies des pragues desigle-uringiers, nov. 1887.)
 - De l'emploi de la cocame dans le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée. (Goz. méd. de Paris, avril-mai 1887.)
- Contribution à l'étude de quelques procédés d'anesthésie par la cocaïne dans

- le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée. (Remarques in $\mathit{Th.\ de\ Spillmann},$ Paris, 1889.)
- Remarques sur les accidents imputables à l'anesthésie par la cocaine dans le traitement de l'hydrocèle. Expériences et Observations. (In Th. de Larabrie, Paris, 1895.)
- Note sur plusieurs concrétions phléholithiques du plexus recto-vésical. (Bull., Soc. anat., mars 1891, t. V, 5° série.)
- Modification à l'opération du phimosis par le procédé dit de Vidal de Cassis (Bull. Soc. anat., févr. 4891, t. V, 5° série.)
- Circoncision. (Bull. Soc. anat., février-mars 1891, t. V, 5° série.)
- De la circoncision envisagée principalement chex l'adulte. Manuel opératoire et pratique simplifiée de l'opération. Soins préliminaires et consécutifs. (Gaz. wéd. de Paris. 1891, n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21.)
 - Note sur un kyste inguinal chez la femme. (Bull. Soc. emat., juillet 1889, t. 111, 5° série.)
- Tuberculose rénale et utérine. Cystite. Néphrotomie. (Bull. Soc. anat., 1891.) Kyste hématique à myéloplaxes du ligament large. (Bull. Soc. anat., ect. 1894.)
- fasc. 49.)

 Cancer de la face latérale droîte de la vessie comprimant l'uretère droit.

 Absence congénitale du rein et de l'uretère ganche. Phénomènes uré-
- ntiques. (Bull. Soc. anat., avril 1888, t. II, 5° série.) Hystéropexie et grossesse. (Observation. In Th. de Pirat. Paris, 1896.)
- La tuberculose testiculaire est-elle locale? (Remarques et obs. In 7h. de
- Damont, Paris, 1900.)

 Présentation de deux cas de fibromes des ligaments larges indépendants de l'utérus. (Bull. Soc. de Chir., 18 juillet 1900.)

Membres.

Essai de traitement méthodique et rationnel des ulcères de jambes. (In Th. de Vaugrente, Paris, 4894.)

Tumeurs néoplasiques des doigts. (Observat. in Th. de Lucaz, 1894.)

Traitement des verrues par la médication interne. (In Titres et Travaux, Paris, 4895.)

- Dilatation ampullaire de la veine fémorale. Difficulté du diagnostic. Complications. (Bull. Soc. anat., juin-juillet 1892, t. VI, 5° série.)
- cations. (But. Soc. ana., para-jumps root, t. vi, s' serie.)

 Note sur une affection non décrite du derme sous-unquéal. Durillon sousunquéal. (Butl. Soc. ana., mars 1888, t. H. 3' série.)
- Du durillon sous-unguéal. Signes et diagnostic. (Avec un rapport de Villar.) , (Bull. Soc. asat., janv. 1889. t. III. 5° série.)
- De l'exchymose dans les fractures des métatarsiens. (Bull. Soc. anat., 1888.)
- Valeur séméiologique de l'ecchymose dans les fractures des métatarsiens.

 (Gaz. méd., mars 1889.)

 Etude expérimentale de la traction par les poids dans le traitement des frac-
- tures du fémur par l'extension dans la rectitude. (Gaz. méd., juin-sept. 1891, nº 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 39.)
 Confection des appareils plàtrés. (In Précis d'Assistance aux opérations. Paris.
- Confection des appareils plâtres. (In Précis d'Assistance aux opérations, Paris 1892.)
- Contribution à l'étude de l'incision exploratrice dans le diagnostic topographique des osiéosarcomes périostiques. D'une cause d'erreur peu commune et peu connue. (Bull. Soc. anat., févr.-mars 1891, t. V, 5° série.)
- Considérations sur le traitement de l'ostéomyélite des os longs. (In Th. de Thelliez, Paris, 1894.)
 - Note sur la pathogénie des corps étrangers organiques des articulations.

 (Bull, Soc. anat., juin 1888, t. H., 3° série.)

 Traitement préventif de l'ankvlose blennorragique nar l'arthrotomie précoce.
 - (Bull. Soc. anat., nov. 1892, t. VI, 5° série.)

 Volumineux molluscum de la cuisse droite. (Bull. Soc. anat., janv. 1890,

 t. III. n° 4.)
 - De l'arthrotomie précoce dans le traitement de l'arthrite blennorragique du poignet. (Observations et remarques ia Th. de Hopenhender. Paris, 1894.)
 - Arthrotomie transrotulienne. (Bull. Soc. anat., juin 1893, t. VII, 5° série.)
 - Des arthrotomies transosseuses. (Remarques in Th. de Tourette, Paris, 1893.)
 - Du traitement des luxations anciennes, en particulier par les méthodes sanglantes. (Gaz. des hép., 21 nov. 1891, nº 136.)
 - Traitement des ulcères de jambe. (Citat. in Reoue médicale, 1896.)

- Fracture du radius diagnostiquée par les rayons X. (Bull. Soc. anat., mai-juin 1896.)
- L'arthrotomie dans le traitement de l'arthrite blennorragique. (Obs. in Th. de Parizeau, 4896.)
- Traitement des fractures obliques du tibia par la suture osseuse. (C. R. du Congrès de Chir. de 1901.)
- La suture osseuse dans les fractures. (C. R. du Congrès international de Méd., Paris, 1900.)
- Un cas de botryomycose. (Présentation à la Soc. de Chir., 20 juillet 4898.)
- Enorme molluseum de la face interne de la cuisse. Poids, 4.470 grammes. (Soc. de Chir., 6 février 1904.)
- Un cas de botryomycose du doigt. (Soc. de Chir., 25 février 1902.)

 Fracture bilatérale de l'objeranc chez un enfant. Présentation du blessé et de
- radiographies. (Soc. de Chir., 19 mars 1902.)

 De l'arthrotomie précoce dans certaines variétés d'arthrites. (C. R. du
- Congrès de Chir., 24 oct. 1963.)

 Deux cas de botryomycose de l'éminence thénar et deux cas de botryomycose
- de la paume de la main, Avec moulages. (Soc. de Chir., 21 février 4905.) Discussion du rapport de M. Nimier. (C. R. du Concrès de Chir., 4905.)
- Sur une cause d'erreur d'interprétation des reproductions radiographiques des traumatismes malifolaires. (Soc. de Chir., 21 mars 1996.)
- Trois nouveaux cas de hotryomycose de la région sous-hyoïdienne, du bras et du hord cubital de la main. Avec moulages. (Soc. de Ckir., 28 mars 4906.)
- Un cas de hotryomycose. Relations de cette lésion avec les accidents du travail...(Soc. de Chir., 27 mars 4907.)

Autres publications.

- Leçons cliniques de M. le Professeur Tillaux. (Passim in Gaz. des hóp. Semaine médicale. — Iribune médicale. — Union médicale. — Archives de gynécologie, 1893-1895.)
- Cliniques chirurgicales de la Pitié et de la Charité (4894-4895) recueillies et rédigées par le D° P. Thiéry, d'après l'enseignement de M. le Professeur

40 PUBLICATIONS DIVERSES ET TRAVAUX DE LABORATOIRE

Tillaux. Paris, 1895, 860 pages.

Une crémation à Göteborg. (Gaz. des h/p., sep. 1891, nº 107.)

Le personnel médical subalterne dans les hópitaux scandinaves. (Gaz. des hóp., 1891, n^{a_1} 47, 49, 52 et 53.)

Statistique du service de clinique chirurgicale de la Charité (vacances de 4894).

(In Titres et Travaux, 4895.)

Conférences d'anatomie et de chirurgie aux Sociétés de la Croix-Rouxe.

(Passim in Bulletin de ces Sociétés.)
Articles critiques divers. (Passim in Gaz. des hon.)

Articles divers de médecine professionnelle. (C. R. des Congrès.)